



598.2

МЗ41

М а т е р и а л ы
к распространению
П Т И Ц
на Урале, в Приуралье
и Западной Сибири

В ы п. 1



Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири: информационные материалы. Екатеринбург: УрО РАН, 1995

В сборнике представлены сообщения, которые расширяют или уточняют имеющиеся в литературе сведения о распространении птиц — местах гнездования, зимовки, путях миграций, районах линьки, залетах. Приведены данные об изменениях в границах ареалов птиц, сведения об их обилии, распределения по гнездовой области.

Сборник адресован орнитологам, биогеографам, преподавателям биологических факультетов, любителям птиц.



доктор
их наук

имы Российской академии
бр).

Береговая ласточка *Riparia riparia*. Колония около 20 пар была в обрыве протоки р.Таз у пос.Тибей-Сале летом 1986 г. У пос.Антипаюта по одной птице пролетело 26 июня и 3 июля 1987 г. У фактории Юрибей 2 ласточки пролетели 12 июля 1989 г.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Над льдом небольшого долинного озера у пос.Тадобьяха 30 июня-2 июля 1988 г. кружились 2 птицы. Одна птица несколько минут находилась на фактории Юрибей 17 июля 1989 г. По сведениям Д.И.Иванова, почти каждое лето с теплым южным ветром несколько птиц заносит на фактории Матюй-Сале. В 1990 г. на этой фактории по одной птице видели 18 июня и 3 июля, а в пос.Гыда одна птица была замечена 23 июня.

Воронок *Delichon urbica*. Одна птица пролетела над г.Тазовским на юго-восток 12 июня 1987 г.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. По одной птице видели у пос.Газ-Сале 21 и 22 августа 1986 г. Самец находился у фактории Матюй-Сале с 24 июня по 4 июля 1990 г.

Сибирская завирушка *Prunella montanella*. Отмечена только у пос.Антипаюта, где встречалась с 26 июня по 20 июля и в конце августа 1987 г. В среднем за период со второй половины июня по вторую половину июля она была наиболее многочисленна в пойменных ольхово-ивовых зарослях с участками осоковых болот и озерами (28 особей/км²) и в осоково-моховых болотах местами с низким кустарником (21 особь/км²).

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Самые северные встречи поющих самцов - у фактории Юрибей и пос.Гыда.

Белобровик *Turdus iliacus*. Самые северные встречи - у поселков Антипаюта и Тадобьяха.

Домовый *Passer domesticus* и **полевой** *P. montanus* воробьи. Гнездятся и зимуют в пос.Газ-Сале и г.Тазовском и, возможно, севернее. На фактории Юрибей 17-22 июля 1989 г. мы видели от 1 до 3 полевых воробьев, а 11-12 сентября 1989 г. в пос.Гыда - около 30 полевых воробьев. Со слов Д.И.Иванова, 11 июня 1990 г. на фактории Матюй-Сале появилась стая из 8, не определенных до вида воробьев. Со дня нашего приезда на факторию (20 июня) по 4 июля мы отмечали от 1 до 3 полевых воробьев и 20 июня - одну самку домового.

Вьюрок *Fringilla montifringilla*. Взрослый самец и молодая птица или самка встречены в пос.Антипаюта 17 августа 1987 г.

В.Д.Захаров, В.С.Назаров, Н.Н.Мигун

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОРНИТОФАУНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Канюк *Buteo buteo*. За все годы исследований на территории Челябинской области интенсивный пролет канюков был отмечен лишь однажды в сентябре 1991 г. в горной части области. Так, 8 сентября 1991 г. в полдень в течение 45 минут наблюдений были зарегистрированы 72 птицы, которые летели на высоте 50-100 м по направлению на юго-юго-запад одиночно и небольшими группами по 2-4 особи, дистанция между мигрантами составляла от 100 до 300 м, пролет шел узкой полосой между горными

хребтами и не превышал по ширине 300 м. Небольшая высота, на которой наблюдались птицы, объясняется сильным встречным ветром. По всей видимости, удалось пронаблюдать лишь фрагмент этого массового пролета, так как остальное время полевые работы проводились в густом елово-пихтовом лесу. В дальнейшем, 9 и 10 сентября, погода ухудшилась, моросил мелкий дождь и низкая облачность ограничивала видимость. И только 12 сентября в 12 часов вновь удалось увидеть в течение 30 минут 32 канюка, летевших на высоте более 300 м в том же направлении. В этом случае ширина пролета была больше и составляла около 1 км. Птицы летели со значительно большими промежутками (до 1 км) и главным образом в одиночку. В течение остального времени дня мигрирующие канюки не наблюдались. Район наблюдений: Катай-Ивановский р-н, 20 км северо-восточнее с. Тюлюк, долина между хр. Нургуш и хр. Уреньга (54° 30' с.ш., 59° в.д.).

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Вблизи с. Кочердык Октябрьского р-на (54° 35' с.ш., 63° в.д.) на пресноводном оз. Забалуево 27 мая 1994 г. обнаружена колония шилоклювок на острове в центральной части озера в 30 м от берега. Остров представлял из себя песчаную отмель с редкой растительностью и имел размеры 50 x 30 м. При повторном обследовании колонии (28 мая 1994 г.) зарегистрировано 19 гнезд с кладками по 4 яйца (лишь в одной - 3). Расстояние между гнездами от 7,5 до 20,5 м, на периферии колонии гнезда находились на расстоянии до 1 м от уреза воды. Кроме шилоклювок на острове гнездились большие веретенники, поручейники, травники, фифи, малые зуйки и малые чайки. Это второе известное колониальное гнездование шилоклювки в пределах Челябинской области. Следует заметить, что в предыдущие годы в этих местах колонии шилоклювок обнаружены не были. Вероятно, появление колонии связано с высоким уровнем воды в 1994 г. и образованием острова, что значительно снизило беспокойство со стороны скота.

Степная тиркушка *Glareola nordmanni*. Известно, что северную границу распространения тиркушки между Волгой и Уралом проводят по 55-й параллели, восточнее Урала она менее ясна и упоминается "район Кустаная". Нами в течение 1993-1994 гг. небольшое поселение тиркушек отмечено в районе с. Кочердык Октябрьского р-на. Птицы гнездились на небольшой песчаной косе (во влажные годы это остров) в количестве 5-6 пар на участке, не превышающем по размерам 10 x 10 м. Севернее этой точки степная тиркушка в области нами не встречена (см. сообщение С.Б. Кулинина в нашем сборнике. - Прим. ред.)

Пеночка-трешотка *Phylloscopus sibilatrix*. Ранее для Челябинской области самые восточные точки встреч были приурочены к Уйскому островному бору (60° в.д.) и Ильменскому заповеднику (60° 25' в.д.). В июне и начале июля 1994 г. два поющих самца отмечались в березово-осиновом колке в 5 км северо-восточнее с. Кочердык Октябрьского р-на.

Желчная овсянка *Emberiza bruniceps*. Два самца встречены 13 мая 1994 г. в ползащитной лесополосе на границе Брединского и Кизильского р-нов в 2 км севернее городища Аркаим (54° 40' с.ш., 59° 30' в.д.).

Белошапочная овсянка *Emberiza leucoccephala*. Самец наблюдался 26 мая 1993 г. в 5 км северо-восточнее с. Кочердык Октябрьского р-на. До этого в области не отмечалась.